

## **MPT сустава с внутрисуставным контрастированием — MPT-артрография**

Поскольку необходимо провести подготовку, **просим прибыть на исследование за 30 минут до назначенного времени.** Исследование длится 30–60 минут.

### **Перед исследованием**

- Вы можете есть и пить как обычно и принимать лекарства, которые Вы ежедневно принимаете.
- Не используйте лечебные пластыри (например, пластырь с никотином, с обезболивающим).
- Украшения и пирсинг необходимо снять перед обследованием. Если у вас есть пирсинг, который вы не хотите снимать, просим заменить его на пластиковый, без металлических частей.
- Наденьте что-нибудь легкое и удобное, что можно легко снять.

### **Во время исследования**

**Перед исследованием радиолог под контролем ультразвука введет в сустав контрастное вещество.**

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет получить точные анатомические изображения человеческого тела с помощью сильного магнитного поля. В ходе исследования не используется ионизирующее или рентгеновское излучение. Исследование безболезненно и позволяет диагностировать многие заболевания. Исследование проводится в устройстве, напоминающем туннель, которое представляет собой открытое с обоих концов, вентилируемое и освещенное пространство.

**Внимание!** Если Вы страдаете клаустрофобией (боязнь замкнутого пространства) или тревожностью, обсудите это со своим лечащим врачом, который при необходимости назначит легкое успокоительное средство. Если станет страшно, также сообщите об этом проводящему исследованию технику-радиологу.

Во время проведения исследования за Вами будут наблюдать через окошко и через камеру; при появлении дискомфорта Вы сможете дать сигнал технику-радиологу с помощью специальной кнопки.

**Успешное исследование требует, чтобы Вы лежали неподвижно на протяжении всего исследования.** Для этого мы постараемся сделать Вашу позу максимально комфортной.



Во время исследования устройство издает громкий шум, поэтому Вам будут предоставлены средства защиты слуха.

### Контраст для МРТ – что нужно знать?

Контрастное вещество, используемое при МРТ, содержит **гадолиний**, который помогает врачу лучше видеть важные области. Современные препараты на основе гадолиния обладают очень низкой токсичностью для почек и в целом безопасны.

#### Пациенты с почечной недостаточностью

- Контраст можно вводить даже пациентам с почечной недостаточностью, включая тех, у кого функция почек значительно снижена (eGFR < 30).
- Если eGFR очень низкий (< 15), после обследования может быть полезно провести гемодиализ.
- Пациентам на гемодиализе можно выполнять МРТ с контрастом при условии, что диализ будет проведён в течение 24 часов после исследования.
- Пациенты на перитонеальном диализе продолжают лечение в обычном режиме.

Гадолиний может со временем накапливаться в некоторых областях мозга, однако клиническое значение этого пока неизвестно.

#### Низкорисковые контрастные препараты для МРТ: Gadovist.

Контраст выводится из организма почками; после обследования рекомендуется пить больше жидкости, чем обычно.

#### Беременность и кормление грудью

- Во время беременности гадолинийсодержащий контраст применяется только в случае крайней необходимости.
- В грудное молоко попадает лишь очень небольшое количество контраста, и вещество полностью выводится из организма в течение 24 часов. При желании мать может сцедить и сохранить грудное молоко перед обследованием, чтобы при необходимости использовать его после исследования. Это не является обязательным, но может дать дополнительную уверенность

### После исследования

В течение оставшегося дня следует избегать излишней нагрузки, такой как тяжелая физическая работа, тренировка или другая деятельность, требующая физических усилий.

Снять пластырь и принять душ можно на следующий день. Воспаление, вызванное инъекцией, встречается очень редко, но если у Вас повышается температура, возникает покраснение кожи или сильная боль, свяжитесь с направившим Вас отделением или семейным врачом либо обратитесь в отделение неотложной помощи.

Результаты исследования Вы узнаете у своего лечащего врача. Если Вы не согласовали время приема или звонка, обратитесь в отделение, которое выдало направление.

